


BOLETÍN PARA PACIENTES IMATINIB

¿IMATINIB?

El **imatinib** pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la cinasa. Actúa al bloquear la acción de la proteína anormal que les indica a las células cancerosas que deben multiplicarse. Eso ayuda a detener la propagación de las células cancerosas.



¿CÓMO SE TOMA IMATINIB?



Debe tomar los comprimidos con una comida y un vaso grande de agua, las veces que se le hayan formulado al día (siempre en los mismos horarios elegidos).

Dígale a su médico qué **productos herbales** está tomando, **sobre todo la hierba de San Juan. No coma toronja (pomelo)** ni beba jugo de toronja mientras está tomando este medicamento.

No abandone este medicamento por cuenta propia, ante cualquier duda o intolerancia marcada mencionar a su médico tratante y/o al Químico farmacéutico para tomar las decisiones adecuadas y además poder ser asesorado al respecto.



ALMACENAMIENTO DEL MEDICAMENTO

Conserve el medicamento en su envase original, etiquetado, a temperatura ambiente y en un lugar seco. Este medicamento no debe guardarse en un pastillero. **Mantenga los envases fuera del alcance de los niños y las mascotas.**

Si un cuidador saca la dosis del medicamento por usted, este debe considerar usar guantes o verter las pastillas directamente del envase a la tapa, una taza pequeña o directamente en la mano (del paciente).



POSIBLES EFECTOS ADVERSOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR AL TOMAR ESTE MEDICAMENTO

Los efectos secundarios de Imatinib:

Diarrea, náusea, vómito, sudores nocturnos, alergia, aumento de peso, dolor faringolaríngeo, vómitos, anemia, hemorragia, calambres, dolor musculoesquelético, espasmo, mareos, dolor de cabeza, insomnio, tos, fatiga, fiebre.



• **Nauseas:** Administrar imatinib en alguna comida principal de acuerdo con la cantidad de veces que lo debe administrar al día dado que ayuda a reducir o controlar este síntoma.



• **Diarrea:** Imatinib puede causar diarrea. Es importante una buena hidratación, tomar mucho líquido en caso de presentarla.



• **Pérdida de apetito:** Algunas personas pierden el apetito. Esto puede ser leve y durar un par de días.



• **Hinchazón en los párpados:** Esto se debe en ocasiones a retención de líquidos en esta zona. Esto no es dañino, pero puede ser molesto o incómodo.



• **A nivel ocular:** Podría presentarse visión borrosa, aumento de lagrimeo, ojo seco.

Es importante si presenta o sospecha de cualquier tipo de síntoma no mencionado es importante comentar durante la consulta para evaluar dicho suceso. **Si tiene efectos secundarios graves avisar inmediatamente a médico tratante.**

Por último, recuerda tomar los medicamentos con regularidad y según las indicaciones médicas, con esto aumentarás los beneficios. **En caso de suspender el medicamento por alguna razón, debes informar a su médico.**



Recuerda

Puedes notificar cualquier sospecha de reacción adversa al programa de farmacovigilancia

E-mail: farmacovigilancia@sumimedical.com